

Rua Engenheiro Guilherme José Monjardim Varejão, 150, Enseada do Sua - Vitória/ES
CEP:29050-260 - (27) 3345-2003

GLUTEOPLASTIA

Atualmente não se admite a cicatriz que não seja a do sulco interglúteo, ou seja, a cicatriz se localiza no sulco formado entre as bandas direita e esquerda da região glútea. A cicatriz passa por todas as suas fases evolutivas e após o 6º mês torna-se imperceptível ao ponto de ninguém notar que você se submeteu a esse tipo de ato cirúrgico.

Existem as próteses redondas, e as ovais. As redondas são utilizadas praticamente em todos os tipos de nádegas porém as ovais são utilizadas nos casos em que os quadris são muito largos tendo que ser preenchido também nas laterais. Você já deve ter ouvido falar em prótese de poliuretano, texturizada, etc., mas no caso do bumbum também é utilizado o tipo liso, bem mais firme e consistente do que as próteses para implante nas mamas.

Assim como no caso das mamas, existem vários tamanhos de próteses para os glúteos. Antes do ato cirúrgico, as próteses deverão ser "provadas" ainda no consultório para estabelecermos qual ou quais tamanhos se harmoniza melhor com o seu corpo. Geralmente levamos os dois números mais próximos ao seu tamanho e durante o ato cirúrgico optamos por aquela que melhor "esculpir" os seus glúteos. Lembramos sempre que o número das próteses é dado de acordo com o seu volume. Por exemplo, a prótese de nº 200 possui 200 ml de silicone e assim sucessivamente.

Apesar de o resultado imediato ser muito bom, somente no "período tardio" é que atingiremos a forma definitiva. Veremos a seguir as diversas fases evolutivas até alcançarmos o resultado almejado:

PERÍODO IMEDIATO: vai até o 2º mês. Neste período apesar dos glúteos se apresentarem com aspecto muito bom, sua forma e volume estarão aquém do resultado planejado. A região se tornará bastante endurecida que nada mais é do que a formação da cápsula fibrosa em volta das próteses. Veremos o que é isto mais adiante.

PERÍODO MEDIATO: vai do 2º ao 4º mês. Neste período os glúteos apresentam uma evolução que tende à forma definitiva. Existe um maior ou menor grau de "inchação", dependendo sempre da evolução de cada pessoa. O aspecto cicatricial encontra-se em plena fase de transição. Apesar da euforia da maioria das pacientes já neste período o resultado ainda não é o esperado.

PERÍODO TARDIO: vai do 4º ao 6º mês ou mais. É o período em que os glúteos atingem seu aspecto definitivo (cicatriz, forma, consistência, volume, sensibilidade, etc.). As próteses são colocadas sob um músculo muito forte e resistente que se chama Músculo Glúteo Máximo, portanto, ao toque, a sensação é a mesma daqueles casos que não tem próteses, mesmo que a cápsula fibrosa seja muito forte.

Todo corpo estranho ao organismo (como as próteses, por exemplo), provoca ao seu redor a formação de uma capa que envolve todo esse corpo que é chamada de cápsula fibrosa. A retração exagerada desta cápsula é que determina certo grau de endurecimento da região, sentida quando palpada, sobretudo nos primeiros meses (período imediato). Um pequeno percentual de casos pode apresentar certas deformidades locais devido a retração muito forte da cápsula fibrosa que poderá ceder com massagens pós-operatórios.

A retração da cápsula nunca reflete imperícia do cirurgião, mas sim de um comportamento anômalo do organismo das pacientes que as apresentam. Felizmente esses casos são excepcionais ficando as maiorias com a forma satisfatória.

Por se tratar de corpo estranho, o organismo "isola" a prótese revestindo-a com a cápsula fibrosa descrita acima. O silicone é um material inerte, ou seja, não provoca reação do tipo rejeição. Como as próteses são colocadas sob o músculo e ainda assim são fechadas pela cápsula fibrosa, não há o risco de elas saírem do lugar.

Além de tudo o que foi descrito acima, as próteses glúteas são as mais duras que existem exatamente para que não se rompam quando acontecer um acidente do tipo queda. É verdade porém que injeções no bumbum não deverão ser mais utilizadas. A agulha da seringa pode provocar perfuração da prótese, portanto está proibido tomar injeção nos glúteos, substituindo-se pelos braços ou pelas coxas. Num caso de emergência, jamais será aplicada injeção nos glúteos pois nesses casos a medicação será sempre administrada pelas veias.

Você poderá se sentar até no mesmo dia da cirurgia se você quiser, tomando alguns cuidados especiais. Porém durante 15 dias você só poderá dormir de bruços. Nem de lado pode. Raramente esse tipo de cirurgia causa sérias complicações. Isso se deve ao fato de se preparar adequadamente cada paciente, além de ponderarmos sobre a conveniência da utilização ou não de outras cirurgias concomitantes.

Você não deve se esquecer que, até que se atinja o resultado desejado, a cirurgia passará por diversas fases já vistas. Se lhe ocorrer a preocupação no sentido "desejar atingir o resultado definitivo antes do previsto", não faça disto motivo de sofrimento: tenha a devida paciência, pois seu organismo se encarregará espontaneamente de dissipar os transtornos que poderão aparecer. É evidente que toda e qualquer preocupação de sua parte deverá ser transmitida ao seu cirurgião.

Fonte: <http://www.umartinelli.com>