

Rua Engenheiro Guilherme José Monjardim Varejão, 150, Enseada do Sua - Vitória/ES CEP:29050-260 - (27) 3345-2003

ABDOMINOPLASTIA

Las cirugías abdominales que presentan mejores resultados estéticos son justamente aquellas en que se hacen las retiradas de piel con grasa. Así es que la mayoría de las mujeres presenta cierta "flaccidez" del abdomen después de un o varios partos, con exceso de piel sobre la cantidad de grasa localizada en la región.

En otros casos, en que el paciente anda con el peso por encima del normal, el resultado también será compensatorio y proporcional al restante del cuerpo, sin embargo, vale la pena acordar que "exceso de grasa" en otras regiones vecinas del abdomen aún existirán, lo que nos lleva a aconsejar a aquellas que así se presenten a proseguir con un tratamiento clínico para equilibrar las diversas partes del cuerpo entre sí.

La cicatriz resultante de una dermolipectomía se localiza horizontalmente inmediatamente por encima de la implantación de los pelos pubicos, prolongándose lateralmente en mayor o menor extensión, dependiendo del volumen del abdomen a ser corregido.

Esta cicatriz es planeada para quedar escondida debajo de los trajes de baño. En los primeros meses, el abdomen presenta una insensibilidad relativa, además de estar sujeto a periodos de "hinchazón", que regride espontáneamente.

En esta fase, podrá quedar con aspecto de "estirado" o "plano". Con el transcurrir de los meses, se va gradualmente alcanzando el resultado definitivo, como sigue las diversas fases:

PERIODO INMEDIATO

Va hasta el segundo mes. En este periodo, a pesar del abdomen presentarse con su aspecto bien próximo al normal, su forma aún está lejos del resultado planeado, pues hasta que se alcance la forma definitiva, surgen "pequeños defectos" aparentes iniciales (ineludibles en todos

los casos), que tienden a desaparecer con el transcurrir del tiempo. Acuérdesse de esta observación: generalmente ninguna cirugía queda "perfecta" en el pos-operatorio inmediato.

PERIODO MEDÍACTO

Va del segundo al cuarto mes. En este periodo, el abdomen comienza a presentar una evolución que tiende a la forma definitiva. No son raros en este periodo una cierta insensibilidad

o hipersensibilidad en el local, como también menor grado de "hinchazón" del abdomen.

PERIODO TARDÍO

Va del cuarto al sexto mes o más. Es el periodo en que el abdomen alcanza su aspecto definitivo (cicatriz, forma, consistencia, volumen, sensibilidad).

El tipo de traje que será usado después del resultado dependerá exclusivamente de su propio

maniquí.

Es claro que los trajes inferiores más "generosos" quedarán por cuenta de los casos en que los resultados sean más naturales. Acuérdesse que el bisturi del cirujano sólo mejora sus propias formas y que esta cirugía no hace "cintura", es decir, quien ya tiene, permanecerá y quien no tiene, tendrá una discreta mejora.

Usted podrá embarazarse después de una cirugía de abdominoplastia. El resultado podrá ser preservado desde que en la nueva gestación su peso sea controlado. Aconsejamos que tenga todos los hijos programados antes de someterse a una dermolipectomía abdominal.

Raramente la cirugía plástica abdominal trae serias complicaciones, desde que realizada dentro de criterios técnicos. Esto si debe al hecho de prepararse convenientemente cada paciente para la cirugía, además de ponderar sobre la asociación de esta cirugía simultáneamente con otras. El peligro no es mayor ni menor que un viaje de avión o de automóvil, o aún el simple atravesar de una calle.

Curativos especiales son utilizados de 3 a 4 días. Posteriormente, los curativos son intercambiados por cintas elásticas que serán mantenidas por dos meses. Utilizamos drenaje de aspiración continua que será retirado hasta el 4º día junto con el curativo especial.

Usted no debe olvidarse que hasta que se consiga alcanzar el resultado anhelado, diversas fases son características de este tipo de cirugía. Así es que, en los ítems anteriores esclarecemos sobre la evolución de la forma del abdomen, así como la sensibilidad, consistencia, etc. Sin embargo, podrá ocurrirle alguna preocupación en el sentido de "desear alcanzar el resultado final antes del tiempo previsto".

Sea paciente, pues su organismo se encargará de disipar todos los pequeños trastornos intermedios. ¿? Es evidente que toda y cualquier preocupación de su parte deberá ser transmitida a su cirujano. En tiempo: en algunas pacientes, ocurre una cierta ansiedad en esta fase, decurrente del aspecto transitorio (edema, insensibilidad, transición de la cicatriz, etc.). Es decir pasajero y generalmente refleja el antojo de alcanzarse el resultado final el cuanto antes. Acuérdesse que ningún resultado de cirugía del abdomen deberá ser considerado como definitivo antes del 6º mes.

En caso de pacientes muy obesas, o algunos casos especiales podrá ocurrir, después del 8º día, la eliminación de razonable cantidad de líquido "rojo-amarillento" por un o más puntos de cicatriz. Este fenómeno es llamado de "lipólise" o "seroma" y nada más es que la eliminación de la grasa residual próxima al área de la cicatriz que está siendo eliminada, sin que eso venga a constituirse en una complicación. El uso del drenaje evita que ese "seroma" se acumule. Aún así puede ocurrir su acumulación que es fácilmente drenado en el consultorio. Las cirugías abdominales que presentan mejores resultados estéticos son justamente aquellas en que se hacen las retiradas de piel con grasa.

Fonte: <http://www.umartinelli.com>