

Rua Engenheiro Guilherme José Monjardim Varejão, 150, Enseada do Sua - Vitória/ES CEP:29050-260 - (27) 3345-2003

## RITIDOPLASTIA

La cirugía de la cara, el cuello y párpados rejuvenecen esos territorios visualmente, sin embargo debe recordarse siempre que "ella tarda pero no interrumpe el proceso evolutivo del organismo."

La cirugía facial es una gran intervención pero, raramente la cirugía del rejuvenecimiento determina serias complicaciones. Sin embargo, siendo un procedimiento quirúrgico, de vez en cuando pueden ocurrir imprevistos en la evolución. Afortunadamente, esto es normalmente susceptible a las revisiones subsecuentes, lo que nos hace posible obtener el resultado ambicionado.

El tabaco actúa directamente sobre la irrigación sanguínea de la piel disminuyéndola sensiblemente. La piel de la cara por su vez es muy fina estando sujeta a sufrir con esa irrigación deficiente pudiendo conllevar el surgimiento de lesiones típicas del sufrimiento cutáneo como el epiteliolise, o mismo la necrosis (muerte) de piel en los casos más serios. Algunos cirujanos defienden la hipótesis que debe detenerse el tabaco por lo menos 15 días antes de la cirugía. Por otro lado ese acto de parar de fumar puede generar ansiedad o irritabilidad que puede ser dañoso para el acto operativo (agitación antes, durante y después de la cirugía). Lo ideal es dejar de fumar espontáneamente y conscientemente para el resto de la vida.

Como apoyo en la mejora de ese flujo sanguíneo nosotros usamos sesiones de oxigenoterapia hiperbárica que consiste en administrar a diario el oxígeno bajo presión con las máscaras nasales en una cámara especial, días antes de la acción quirúrgica. Normalmente se usan curativos con crespón que envuelve la cabeza entera. Ese curativo es quitado alrededor de las primeras 24 horas, pudiendo quedarse sólo un curativo liviano sobre las cicatrices residuales.

Recomendamos la aplicación de compresa remojada en el agua fría sobre los ojos. Esto reduce la intensidad del edema postoperatorio en los ojos. (Mire en Blefaroplastia).

La evolución de la cirugía de la cara es en general sin dolor. De vez en cuando un caso u otro puede presentar discreto dolor que será perfectamente sedado con los analgésicos de línea común. La mayoría de los puntos de los párpados se los son quitados después de 7 días. Los restos (cara, cuello, cuero cabelludo), entre el 7º y el 10º día.

Usted no debe olvidarse que, hasta que se consiga alcanzar el resultado ambicionado, varias fases evolutivas son características de este tipo de la cirugía. De esa manera es que los edemas (hinchazón), "manchas" infiltrado sanguíneo, hipersensibilidad de algunas áreas, insensibilidad de otras, son comunes a todos los pacientes; evidentemente, algunos presentarán estos fenómenos con la intensidad más pequeña que otros. Dé tiempo, que su organismo se encargará de disipar todos estos pequeños trastornos que puedan aparecer.

A tiempo: Un período corto de "depresión emocional" podrá ocurrir en los primeros días, debido al aspecto

transitorio. Ése es pasajero y normalmente ocurre lo más pronto posible de la "ansiedad en alcanzar el resultado final". Tenga paciencia. Recuerde que ningún resultado de cirugía estética de la cara debe evaluarse antes del 6° mes de postoperatorio.

La cirugía de la cara es muy satisfactoria, pero cada caso se analiza individualmente, durante la 1a consultación. Algunas pacientes buscan, con esta cirugía, estar "más bonita". Éste no es el objetivo fundamental de la cirugía, su objetivo primordial es el rejuvenecimiento. En esa ocasión, nosotros debemos explicar todo los detalles que aquí fueron dichos. Desde que nosotros decidamos realizar la cirugía mutuamente (médico y paciente) es porque el resultado compensa.

Fonte: <http://www.umartinelli.com>